

## XX Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne

Austria, 25–27 czerwca 1997

*Zawody indywidualne, I dzień (25.06.1997)*

1. Proste  $l_1$  i  $l_2$  przecinają się w punkcie  $P$ . Okręgi  $S_1$  i  $S_2$  są styczne zewnętrznie w punkcie  $P$  i prosta  $l_1$  jest ich wspólną styczną w tym punkcie. Podobnie, okręgi  $T_1$  i  $T_2$  są styczne zewnętrznie w punkcie  $P$  i prosta  $l_2$  jest ich wspólną styczną w tym punkcie. Okręgi  $S_1$  i  $T_1$  przecinają się w punktach  $P$  i  $A$ . Podobnie, okręgi  $S_1$  i  $T_2$  przecinają się w punktach  $P$  i  $B$ , okręgi  $S_2$  i  $T_2$  w punktach  $P$  i  $C$  oraz okręgi  $S_2$  i  $T_1$  w punktach  $P$  i  $D$ . Udowodnić, że punkty  $A$ ,  $B$ ,  $C$  i  $D$  leżą na okręgu wtedy i tylko wtedy, gdy proste  $l_1$  i  $l_2$  są prostopadłe.
2. Dana jest szachownica mająca  $m$  kolumn i  $n$  wierszy. Każde pole ma współrzędne  $(x, y)$ , gdzie  $x$  jest numerem kolumny ( $1 \leq x \leq m$ ), a  $y$  jest numerem wiersza ( $1 \leq y \leq n$ ). Następnie niech  $p$  i  $q$  będą liczbami całkowitymi dodatnimi. Pionek stojący na polu  $(x, y)$  może poruszyć się na pole  $(x', y')$  wtedy i tylko wtedy, gdy
$$|x - x'| = p \quad \text{i} \quad |y - y'| = q.$$
Na każdym polu stoi jeden pionek. Chcemy jednocześnie wykonać ruch wszystkimi pionkami tak, aby znów na każdym polu stał tylko jeden pionek. Na ile sposobów można to zrobić?
3. Na tablicy napisano 97 liczb: 48, 24, 16, ..., 48/97, tzn. liczby wymierne  $48/k$  dla  $k = 1, 2, \dots, 97$ . W każdym kroku wybieramy dowolnie dwie liczby  $a$  i  $b$  napisane na tablicy, wycieramy je i wpisujemy liczbę  $2ab - a - b + 1$ . Po 96 krokach na tablicy pozostanie dokładnie jedna liczba. Wyznaczyć zbiór liczb, które mogą pozostać na tablicy.

*Zawody indywidualne, II dzień (26.06.1997)*

4. W czworokącie wypukłym  $ABCD$  boki  $AB$  i  $CD$  są równoległe. Przekątne  $AC$  i  $BD$  przecinają się w punkcie  $E$ . Następnie, punkt  $F$  jest punktem przecięcia wysokości trójkąta  $EBC$ , a punkt  $G$  punktem przecięcia wysokości trójkąta  $EAD$ . Udowodnić, że środek odcinka  $GF$  leży na prostej przechodzącej przez punkt  $E$  i prostopadłej do  $AB$ .
5. Niech  $p_1, p_2, p_3, p_4$  będą czterema różnymi liczbami pierwszymi. Udowodnić, że nie istnieje wielomian trzeciego stopnia  $Q(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  o współczynnikach całkowitych taki, że
$$|Q(p_1)| = |Q(p_2)| = |Q(p_3)| = |Q(p_4)| = 3.$$
6. Udowodnić, że nie istnieje funkcja  $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$  taka, że  $f(x + f(y)) = f(x) - y$  dla wszystkich liczb całkowitych  $x, y$ .  
*Uwaga:*  $\mathbf{Z}$  jest zbiorem liczb całkowitych.

*Zawody zespołowe (27.06.1997)*

7. a) Udowodnić, że dla dowolnych liczb rzeczywistych  $p, q$  zachodzi nierówność
$$p^2 + q^2 + 1 > p \cdot (q + 1).$$
b) Wyznaczyć największą liczbę rzeczywistą  $b$  taką, że dla wszystkich liczb rzeczywistych  $p, q$  zachodzi nierówność
$$p^2 + q^2 + 1 \geq b \cdot p \cdot (q + 1).$$
c) Wyznaczyć największą liczbę rzeczywistą  $c$  taką, że dla wszystkich liczb całkowitych  $p, q$  zachodzi nierówność
$$p^2 + q^2 + 1 \geq c \cdot p \cdot (q + 1).$$
8. Niech  $n$  będzie liczbą naturalną i niech  $M$  będzie zbiorem  $n$ -elementowym. Wyznaczyć największą liczbę naturalną  $k$  o następującej własności:  
Istnieje  $k$ -elementowa rodzina  $K$  trójelementowych podzbiorów zbioru  $M$  taka, że każde dwa zbiory należące do  $K$  mają niepuste przecięcie.
9. Dany jest równoległoscian  $P$ . Niech  $V_P$  będzie jego objętością,  $S_P$  polem jego powierzchni, a  $L_P$  sumą długości jego krawędzi. Dla liczby rzeczywistej  $t \geq 0$  niech  $P_t$  będzie bryłą złożoną ze wszystkich punktów  $X$ , których odległość od  $P$  jest nie większa od  $t$ . Udowodnić, że objętość bryły  $P_t$  wyraża się wzorem

$$V(P_t) = V_P + S_P \cdot t + \frac{\pi}{4} \cdot L_P \cdot t^2 + \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot t^3.$$

*Wyjaśnienie:* Odległość punktu  $X$  od równoległoscianu  $P$  jest nie większa od  $t$ , jeśli istnieje punkt  $Y$  należący do równoległoscianu taki, że  $|XY| \leq t$ .